

Есть вкрапления осинников, много рябины. Гнездовое дерево располагалось у дороги, где часто ходят люди. Из летка дупла высывался уже подросший птенец. При мне прилетала самка и кормила его.

12 июня 2008 на том же участке леса, примерно в 100 м от описанного, снова найдено гнездо трёхпалого дятла. Дупло было сделано на высоте 4 м в стволе осины, растущей в 5 м от дороги. Птенцы уже высывались из дупла. Обе взрослые птицы приносили им корм.

Литература

- Бардин А.В. 2002. Трёхпалый дятел *Picoides tridactylus* (L.) // *Красная книга природы Ленинградской области. 3. Животные*. СПб: 415-416.
- Головань В.И. 2006. Территориальное распределение и численность дятлов на двух модельных площадках на юго-западе Ленинградской области // *Рус. орнитол. журн.* **15** (306): 19-23.
- Ингинен М.П., Борель И.В., Нецепляева И.С. 2010. Птицы Гатчинского ландшафтного парка (по наблюдениям 2008-2009 годов) // *Рус. орнитол. журн.* **19** (541): 6-14.
- Мальчевский А.С., Пукинский Ю.Б. 1983. *Птицы Ленинградской области и сопредельных территорий: История, биология, охрана*. Л., 1: 1-480.
- Попов И.Н. 2005. Встречи трёхпалого дятла *Picoides tridactylus* в Баболовском парке города Пушкина // *Рус. орнитол. журн.* **14** (289): 501-502.
- Попов И.Н. 2007. Птицы Баболовского парка // *Рус. орнитол. журн.* **16** (339): 3-27.



ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2010, Том 19, Экспресс-выпуск 561: 597-598

Поиски саксаульной сойки *Podoces panderi ilensis* в Южном Прибалхашье в 2003 году

А.Ж.Жатканбаев

Лаборатория орнитологии и герпетологии, Институт зоологии МОН РК, Аль-Фараби, 93, Академгородок, Алматы, 050060, Республика Казахстан. E-mail: wildlife@nursat.kz

Поступила в редакцию 19 января 2010

В 2003 году мы предприняли специальную поездку в Южное Прибалхашье с целью нахождения илийской саксаульной сойки *Podoces panderi ilensis* Menzbier et Schnitnikov 1915. При посещении 21-22 марта 2003 участка, где в 2002 году жила пара соек, и проведении автомобильного маршрутного учёта (60 км) по территориям вглубь пустыни на 30 км к северо-востоку от посёлка Карой (Балхашский район, Алматинская область) саксаульных соек обнаружить не удалось. Видимо, на результате сказалась краткосрочность обследования местообитаний,

на большей части которых в это время ещё лежал слой снега толщиной 10-15 см, начинающий интенсивно таять днём.

Интересно отметить, что серый жаворонок *Calandrella rufescens* уже прилетел в большом количестве в полупустынную местность Южного Прибалхашья. Самцы интенсивно пели (отснято на видео), несмотря на ещё зимний облик пустыни (но днём было тепло, до +5-12°C). В отличие от 2002 года, когда во второй и третьей декадах февраля наблюдались положительные температуры воздуха даже ночью (до +1-2.5°), вторая половина февраля и весь март 2003 года были необычайно многоснежными и холодными, с ночными морозами до минус 20-36°C (Б.Карсыбеков, метеостанция Казгидромета «Ауыл № 4»).

21 марта 2003 мы слышали звуки, очень похожие голос саксаульной сойки. Но, скорее всего, эти звуки были имитированы серым жаворонком. Ранее уже отмечалось подражание этих жаворонков голосу саксаульной сойки (Губин и др. 1985, 1990). Сохранение в репертуаре жаворонков этих звуков, хотя и косвенно, свидетельствует об обитании на этом участке саксаульных соек, где в 2002 году пара успешно вырастила двух птенцов.

Литература

- Губин Б.М., Ковшарь А.Ф., Левин А.С. 1985. Распространение, размещение и гнездование у илийской саксаульной сойки // *Бюл. МОИП. Отд. биол.* **90**, 6: 37-45.
- Губин Б.М., Ковшарь А.Ф., Левин А.С. 1990. Илийская саксаульная сойка – *Podoces panderi ilensis* Menzb. et Schnitn., 1915 // *Редкие животные пустынь*. Алма-Ата: 194-208.



ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2010, Том 19, Экспресс-выпуск 561: 598-602

О встречах птиц в Центральном Ескене осенью 2009 года

В.В.Хроков, В.П.Мищенко

Общество любителей птиц «Ремез», Алматы, Казахстан. E-mail: vkh.remez@mail.ru

Поступила в редакцию 11 января 2010

Территория Центрального Ескене расположена в Северо-Восточном Прикаспии (восточнее Атырау) и представляет собой пустынные ландшафты с относительно бедной растительностью и многочисленными сорами. Южную её часть занимают влажные приморские луга. Почти всюду почва покрыта ракушками – в прошлом это было дно